

ÉTUDES ARACHNOLOGIQUES

34^e Mémoire (1)

par E. SIMON.

LIV

ARACHNIDES RECUUEILLIS A SUMATRA PAR M. J. BOUCHARD.

Les Arachnides qui font l'objet de ce travail ont été capturés par M. J. Bouchard dans la province de Palembang, Sud-Est de Sumatra, les uns dans le marais de Babatou au niveau de la mer, les autres dans la vaste forêt du Nirou, qui s'étend au loin dans l'intérieur et qui est presque impénétrable.

Cette région est beaucoup moins connue que la partie occidentale de Sumatra; T. Thorell en a cependant signalé 38 espèces (2) recueillies par H. O. Forbes dans les provinces de Lompong et de Palembang (3) et faisant partie de la collection O. P. Cambridge.

1. *SELENOCOSMIA JAVANENSIS SUMATRANA* Thorell, St. Rag. Mal. etc., IV, I, 1890, p. 395. — Très commun dans la forêt du Nirou.

M. J. Bouchard a observé que cette grosse Araignée creuse un profond terrier, le plus souvent au pied des arbres et contre les racines, dont l'orifice est plus ou moins dissimulé par des feuilles ou des débris et dont le trajet, toujours difficile à suivre, est sinueux pour contourner les obstacles, changeant souvent de direction presque à angle droit.

2. *HERENNIA ORNATISSIMA* (Doleschall). — Marais de Babatou.

Espèce très répandue dans l'Inde, l'Indo-Chine et la Malaisie.

3. *GASTERACANTHA ARCUATA* (Fabricius).

Marais de Babatou.

(1) Voir pour les Mémoires 1 à 33, I à LIII, *Annales de 1873 à 1903*.

(2) Cf. *Studi sui Ragni Malesi e Papuan*, parte IV, in *Ann. Mus. civ. Genova*, 1889-1890.

(3) Cf. H. O. Forbes, *A Naturalist's wanderings in the Eastern Archipelago*, Londres, 1885.

Une femelle capturée par M. Bouchard au moment de l'accouplement, porte un petit mâle fixé à sa face ventrale où il est retenu par l'une de ses pattes-mâchoires encore engagée dans l'orifice génital.

La dissemblance sexuelle est si considérable que, sans cette circonstance, des doutes seraient restés sur l'identité spécifique des deux individus.

Le mâle ne mesure en effet qu'un millimètre et demi, tandis que la femelle en mesure dix sans les grandes épines; son céphalothorax, très différent de celui de la femelle, ressemble à celui des autres mâles connus de *Gasteracantha*: son abdomen, à épines courtes, épaisses et coniques, rappelle beaucoup plus celui du *G. bireispina* Doleschall, que celui du *G. arcuata* Fabr.

Je ne puis en donner qu'une description incomplète, car dans la situation où il se trouve, sa face dorsale est seule visible.

♂ long. 4,5 mill. — *Cephalothorax fusco-castaneus, antice sensim dilutior, oculus, in medio valde concavus, antice posticeque fere aequaliter et valde declivis, fronte arcuata, oculis mediis prominulis, oculis laterilibus a mediis sat distantibus, elevatis et conicis. Abdomen fulvo-olivaceum, pubescens, spinis posticis floridis, latius quam longius, antice leviter prominulum, obtuse truncatum, rix emarginatum, spinis sex armatum, utrinque spinis binis a sese appropinquatis, 1^a minutissima, 2^a majore, crassa et conica, rix longiore quam latiore, et postice spinis binis praecedentibus similibus, sigillis ut in femina ordinatis, sed minutissimis. Pedes breves, fulvo-olivacei, fusco-rufulo annulati.*

4. **Gasteracantha Bouchardi**, sp. nov. — *Scutum abdominalis long. 8 mill., lat. 4,5 mill. — Cephalothorax fere laevis, niger, ad marginem frontalem paulo dilutior et rufescens-tinctus, albido-crinitus. Sternum nigrum, immaculatum. Chelae, pedes-maxillares pedesque nigri, laminis intus, coris ad apicem, praesertim posticis, paulo dilutioribus. Abdomen supra laeve sed ad marginem rugosum, nigrum, vittis transversis trinis sat angustis, pallide floridis, 1^a marginali leviter arenata, 2^a, inter spinas principales ducta, recta, 3^a angustiore et flexuosa, postice pone rimam nigrum, macula media transversa et utrinque puncto minutissimo laete floris decoratum, subtus crebre rugosum, nigrum, punctis floris parvis et paucis conspersum, spinis et supra et subtus nigro-cyanis nitidis. Scutum dorsale transversim fusiforme, antice in medio rix prominulum et leviter sinuoso-emarginatum, utrinque attenuatum, antice plagulis ocelliformibus quatuor sat magnis breviter ovatis et subangulosis inter se subsimilibus (medianis rix minoribus) in lineam rectam, plagulis medianis quatuor transversim*

oratis (*posticis anticis majoribus*), *trapezium evidentem latius quam longius et postice quam antice latius occupantibus, utrinque, secundum marginem anticum, *plagulis trinis majoribus angulosis* (cum *plagulis medianis quatuor, lineam arcuatam designantibus*) et secundum marginem posticum *plagulis fere similibus binis*, atque postice *plagulis seriatis quinque subrotundis sat magnis sed media minutissima suepe bipartita, ad marginem serpentinum, spinis anticis parvis conico-annuminatis, antice oblique directis, spinis mediis anticis plus duplo longioribus, divaricatis et rectis (interdum leviter arcuatis leviter depresso, apicem versus leviter attenuatis et subacuminatis, spinis posticis ad basin crassis sed apice valde attenuatis atque acutis, spinis anticis longioribus sed medianis multo brevioribus.**

Marais de Babatou.

Se rapproche de *G. nigristernis* E. Sim., par son sternum entièrement noir et par la proportion de ses épines abdominales; en diffère surtout par ses épines latérales beaucoup plus grèles et atténuees et par la disposition de ses plaques ocelliformes ou sigilla, les quatre antérieures plus grosses sont placées sur la même ligne que les latérales et le trapèze figuré par les quatre médianes est visiblement plus large que long.

NOTA. — Nous ajoutons ici la description d'une troisième espèce du même groupe qui n'a pas été recueillie par M. J. Bouchard :

Gasteracantha Marsdeni, sp. nov. — *Scutum abdominale long. 8 mill., lat. 45,2 mill. — Cephalothorax fere laevis, niger, parve et breviter albido-pilosus. Sternum nigrum immaculatum, laeve. Chelae, pedes-maxillares, pedesque nigri, laminis intus corisque ad apicem leviter dilutioribus. Abdomen supra laeve sed ad marginem minute rugosum, pallide flavum, lineis transversis angustis nigris binis, 1^a recta inter spinas principales dueta, 2^a sinuosa, postice, pone rimam, nigrum, macula transversa flava notatum, subtus antice sublaeve utrinque et postice minute rugosum, nigrum, punctis flavis, minutissimis et paucissimis ornatum. Scutum dorsale transversim fusiforme, multo latius quam longius, antice prominulum et leviter sinuoso-emarginatum, utrinque valde attenuatum, antice *plagulis ocelliformibus quatuor* parvis, longitudinaliter oratis, inter se subaequis medianis *rix minoribus* in lineam rectam, *plagulis medianis quatuor* sat parvis (*posticis anticis majoribus*) transversim late oratis, *trapezium haud latius quam longius et postice quam antice latius occupantibus, utrinque, secundum marginem anticum, *plagulis trinis reliquis majoribus, transversim longe***

oratis, et secundum marginem posticum plagulis paulo minoribus binis, atque postice plagulis seriatis quinque parris et subrotundis (media minore), impressum, ad marginem sexspinosum, spinis anticis parris, acutis antice oblique directis, spinis medianis anticis plus triplo longioribus, dicaricatis et subrectis (interdum rix arcuatis) leviter depresso, apice haud attenuatis, obtusis sed breviter et acute mucronatis, spinis posticis ad basin crassis sed acutis, spinis anticis majoribus sed medianis saltem duplo brevioribus.

Sumatra : Delhi.

Cette espèce est très voisine de *G. nigristernis* E. Sim., elle s'en rapproche par le sternum noir sans tache et par la disposition des points ocelliformes du scutum abdominal, elle s'en distingue surtout par les épines latéro-médianes beaucoup plus grêles, non dilatées à la base, les épines postérieures plus courtes, le scutum abdominal plus transverse, jaune avec deux étroites bandes noires.

5. CRYPTOTHELE SUNDAICA Thorell, Ann. Mus. Civ. Gen., 2^a s., X, 1890, p. 305.

Forêt du Nirou.

Décrir de Pinang, indiqué depuis de Singapore (Workmann) : nous l'avons reçu de Java.

6. HETEROPODA REGIA (Fabricius).

Forêt du Nirou.

Déjà indiqué de Sumatra.

7. **Panaretus nirounensis**, sp. nov. — ♀ Long. 25-30 mill. — *Cephalothorax evidenter longior quam latior, parte cephalica fere plana, antice attenuata, parte thoracica paulo convexiore et postice abrupte decliri, sulco lato et profundo omnino divisa, fusco-castaneus, breviter albo fulvoque pubescens, regione oculari margineque clypei longius aurantiaco-pilosus. Oculi antici in lineam rectam, medii lateralibus vir 1/4 minores et a se se quam a lateralibus paulo remotiores. Oculi postici in lineam latiorem, valde recurvam, medii a lateralibus quam inter se paulo remotiores, laterales prominuli mediis saltem 1/3 maiores (lateralibus anticis similes). Oculi quatuor medii arram longorem quam latiorem et postice quam antice paulo latiorem occupantes, antici posticis maiores. Clypeus leviter proclivis, oculis anticis plus duplo latior. Abdomen pulchre ovatum, supra fuscum et cerebre aurantiaco-pubescent, alvincque parce albo-punctatum atque in parte apicali lineola alba transversa tenui et sinuosa ornatum, in lateribus et subtus atrum, lineolis tenuibus binis abbreviatis, fulvo-pilosus notatum. Mamillae fuscae. Che-*

lar validae et longae, ad basin geniculatae et aurantiaco-pilosae, prae-terea glabrae, margine inferiore sulci dentibus quatuor validis et sub-contiguis, ultimo reliquis paulo minore, instructo. Partes oris, corae sternumque atro-castanea. Pedes, praesertim postici, insigniter longi et sat graciles, fuscocastanei, subtus fulvo supra breviter cinereo-albido pilosi, metatarsis sat gracilibus, sed anticis usque ad basin, posticis tantum ad apicem crebre et breviter cinereo-nigro-scopulatis, aculeis numerosis ordinariis armati. Plaga genitalis antice depressa et bisulcata, dein foreolis binis oratis, septo piano a sese separatis, postice concreta atque in declivitate foreola parva triquetra impressa.

A P. (Urgulania) borneensi Thorell, cui praesertim affinis est, differt sec. Thorell) pictura alba abdominis et tibiis posticis feminae haud linealis.

Forêt du Nirou.

NOTA. — Les *P. borneensis* et *nirounensis* s'éloignent des formes typiques du genre par leurs pattes beaucoup plus longues et moins robustes, surtout les postérieures, et garnies de pubescence courte et égale.

8. **Codeta Bouchardi**, sp. nov. — ♂ Long. 7.5 mill. — *Cephalothorax niger, utrinque linea crebre albido-luteo-pilosa cinctus, supra obscure olivaceo-pubescent et lineolis abbreviatis, in parte thoracica radiantibus, rufulo-pilosus notatus. Pili oculorum pauci fuscocubri. Clypeus sat angustus, glaber. Abdomen angustum nigrum, supra ritta media lata et orata fulro-macanti-pilosa, in parte secunda lineolis parris obliquis binis maculaque apicali parra niveo-pilosus, in lateribus, antice vitta luteo-roseo-pilosa dein macula orata longitudinali alba marginatum. Chelae sat longae et nitidæ, piceæ, intus dilutiores, parce nigro-crinitæ, antice, usque ad apicem, obtuse canaliculatae, margine inferiore sulci longe obliquo, dentibus validis trinis, inter se subaequis et subcontiguis, denteque ultimo multo minore armato, ungue longo, simplici arcuato. Partes oris sternumque fuscoc-olivacea, laetitia. Pedes longi, fuscoc-olivacei, coris femoribusque saltem ad basin, dilutioribus et fulvis, tibiis anticis ad apicem, posticis prope medium, annulo parvo fulro et albido-piloso notatis, metatarsis anticis fere nigris, posticis confuse annulatis, tibiis anticis aculeis inferioribus sat validis 3-3 utrinque lateralibus binis supra dorsalibus binis minoribus, metatarsis tibiis vir brevioribus, aculeis inferioribus medioribus 2-2, a sese remotis, aculeisque lateralibus armatis. Pedes posticii numerose aculeati, tibiis cunctis aculeis dorsalibus munitis, metatarsis posticis tibiis longioribus. Pedes-macillares breves et robusti, nigri, patella tibiaque supra*

erasse et longe niveo-pilosis: femore subrecto subtus nutico: patella virginiore quam latiore: tibia patella breviore et paulo latiore, subtus processu brevi arcuato et obtusissimo, extus apophysi apicali dicaricata, longa gracili et leviter sursam curvata instrueta: tarsو ovalе, convexo, extus ad basin depressione magna triquetra, subaente marginata, mutuato: bulbo magno, fere disciformi, stylo, apice libero et retro incurvo, circumdato.

Forêt du Nirou.

9. **Hispo alboguttata**, sp. nov. — ♀ Long. 8 mill. — *Cephalothorax planissimus, fere Holoplatidis, longe ovatus, parte cephalica utrinque pene oculos ser. 2^{me} valde constricta, fulvo-olivaceus, parte cephalica antice atque in medio nigrivanti et prope oculos posticos maculis nigris notata, thoracica confuse et sinuose fusco-striolata, subtiliter coriaceus, opacus et pilis crassis pronis albido-luteis conspersus. Oculi antici maximi, a se contigui, pilis albidis paucis cincti. Clypeus virgillus. Abdomen longum et angustum, sed postice leviter ampliatum, supra fusco-testaceum et parce fulvo-pubescent, prope marginem anticum punctis minutissimis quatuor, paulo ante medium maculis binis subrotundis, in parte apicali maculis binis paulo minoribus et transversim remotioribus niveo-pilosis et prope apicem punctis parvis quatuor luteis, cunctis late nigro-aureolatis decoratum, subtus fulvo-testaceum utrinque punctis albis seriatis notatum. Chelae brevissimae (oculis mediis hanc longiores) fulvae et nitidae, margine inferiore sulci dentibus minutissimis quatuor armato. Partes oris sternutaque pallide lutea lucia. Pedes flavidi, patellis tibiisque 1^{er} paris infuscatis et olivaceis, pedes antici reliquis multo robustiores, femore late clavato, patella tibiaque ortis, metatarso tarsо breviore, aculeo metatarsali submedio interiore minutissimo excepto, nutrici, pedes postici tibiis aculeis inferioribus debilibus binis uniserialis, metatarsis aculeis apicalibus similibus binis armatis. Pedes-marijillares pallide lutei subpellucentes, tarsо subtus nigro-crinito. Mamillae nigrae, superiores vitta niveo-pilosa supra ornatae.*

Forêt du Nirou.

10. **Copocrossa harpina**, sp. nov. — ♀ Long. 3 mill. — *Cephalothorax humilis, longe ovatus, superne deplanatus, fulvo-lividus, parre albo-pilosus, vitta marginali lata dilutiore et densius albo-pilosa utrinque notatus, parte cephalica utrinque, prope oculos, nigra et lineolis binis abbreviatis fuscis notata. Pili oculorum et clypei albi. Oculi antici inter se contigui et valde inaequales. Abdomen longum et angustum, parallellum, antice truncatum, postice obtusum virgillum, fulcum,*

supra albo-pubescentis et vittis fulvis transversis sex notatum, vittis 1^o et 2^a sat angustis, 3^a et 4^a latis, ultimis binis tenibus, subtus parcus albo-pubescentis. Chelae brevissimae et partes oris fusco-olivaceae. Sternum pedesque pallide lutea subpellucientia, tibia 1^o parvis longe orata, subtus, in dimidio apicali, aculeis validis fuscis 3-3, metatarsi longo et curvato, aculeis sat brevibus sed validis, erectis et reclinatis 2-2 subtus armato. Mamillae testaceae. Plaga genitalis parva, fusco-rufula.

Forêt du Nirou.

11. **Agorius formicinus**, sp. nov. — ♂ Long. 7-8 mill. — *Cephalothorax laevis, nitidus et fere glaber, prope marginem frontalem parce nigro-crinitus, fusco-castaneus utrinque prope oculos niger. Pili oculorum pauci albi. Abdomen longissimum, antice convexum, in medio longissime constrictum et cylindraceum, postice ampliatum, convexum et oratum sed apice truncatum, nigrum apice saepe paulo dilutius, supra duriusculum nitidum, parce et longe nigro-crinitum. Chelae breves, antice convexae, fulvo fuscove rufulae, laeves. Partes oris castaneae. Sternum nigrum laeve. Pedes graciles. Pedes 1^o parvis fusco-olivacei, cornu trochanterique dilutioribus sed utrinque fusco-rittatis, patella ad apicem tibia, metatarsi, tarsoque fulvis, pedes 2^o parvis plavidi, femore subtus fusco-lineato, pedes postici fusco-ravidi, trochanteribus, patellis ad basin, metatarsis ad apicem tarsisque luteis, pedes 4^o parvis, saltem femore tibiaque, longius pilosi. Pedes maxillares nigricantes breves et robusti, femore subrecto subtus in parte apicali convexo, patella longa supra ad basin obtuse prominula, tibia multo breviore, altiore quam longiore, extus convexa et apophysa fere superiore sat brevi robusta et curvata armata, tarso exuto et obtuso bulbum parum superante.*

Forêt du Nirou.

Ab A. constricto E. Sim. (1) cui affinis est imprimis differt tarso pedum-maxillarium brevi et obtuso.

12. **Telamonia leucaspis**, sp. nov. — ♂ Long. 4 mill. — *Cephalothorax fusco-piceus, proprie oculos niger, parte thoracica in medio atque ad marginem late dilutiore et rufescenti, crebre cinereo-mixtanti-squamulatus, citta submarginali lata et integra albo-squamulata cinctus, parte cephalica macula media frontali et utrenque, inter oculos, macula minore subtriangularis, parte thoracica macula media*

(1) A. constrictus E. Simon, Ann. Soc. ent. Belg. XLV, 1901, p. 144. Une erreur pour la taille qui est de 7 à 8 mill., au lieu de 5. — De Singapore.

ovata longitudinali et utrinque punctis binis albo-argenteo-squamulatis ornatis. Pili oculorum albi, oculorum lateralia falso-rufuli. Clypeus latus, utrinque nudus, sub oculis mediis macula laete albo-argenteo-squamulata ornatus. Abdomen angustum, supra crebre albido-flavido-squamulatum, vitta media lata et integra fusca, leviter sinuosa, in medio albido-nigra-squamulata notatum, subtus pallide testaceum et omnino albo-argenteo squamulatum. Chelae sat longae, nigrae, opacae, valde transversim plicatae. Partes oris fuscae. Sternum fulcum, albo-argenteo-squamulatum. Pedes 1^o parvis fusco-rufuli, metatarso tarsaque flavidis, tibia in medio dilatior et annulo albo-squamulato ornata, reliqui pedes flavidis, femore patella tibiane 2^o parvis rix infuscatis, tibiis antice aculeis inferioribus 3-3 (apicalibus minoribus), intus aculeis lateralibus trinis extus binis, metatarsis aculeis inferioribus 2-2 et utrinque lateralibus binis armatis. Pedes postici numeroso aculeati. Pedes-macillares graciles, pallide flavidis, albo-pilos; tibia patella breviore, apophysi apicali parva gracili recta et acuta extus armata; tarsos sat longo, tibia hand latiore, cylindrato, apicem versus levissime ampliato et currato; bulbo ad basin dentato, apicem versus longe et sensim attenuato et stylo apicali tenui munito.

A T. olorina E. Sim. cui praesertim affinis est differt fronte hand cinereo-cristata, clypeo utrinque nudo sed macula media argentea notata (in T. olorina omnino crebre argenteo-squamulata), parte thoracica utrinque albo-bipunctata, abdome subtus haud infuscato, pedibus antice brevioribus, apophysi tibiali recta, etc.

Forêt du Niro.

13. **Cosmophasis umbratica**, sp. nov. — ♂ Long. 5 mill. — *Cephalothorax altus, niger, parte cephalica antice parce viridi-aneo-squamulata, thoracica antice, pone oculos, linea transversa leviter recurva, poslice, in declivitate, macula ovata, similiter squamulata, ornata. Pili oculorum albi. Clypeus oculis mediis c. e angustior, in medio et utrinque in genis sat longe et crasse albo-pilosus. Abdomen angustum et longum, antice obtuse truncatum, postice acuminatum, nigrum, supra nigro-nigra-squamulatum, ad marginem anticum vitta transversa, in parte apicali punctis farvis binis, niveo-squamulatis, ornatum, subtus sere glabrum, sed utrinque antice linea tenui, postice macula longa, albo-pilosis, marginatum. Mamillae nigrae. Chelae longae, sere parallelae, antice deplanatae, nigrae, transversim striatae et parce albo-pilosae sed ad apicem area laeviore et glabra notatae, extus in dimidio apicali tenuiter carinatae et intus, ad marginem apicalem, minute dentatae, subtus rufulae, marginibus sulci longis et dentibus remotis,*

ungue longo, rufulo, compresso et supra carinato. Partes oris nigrae. Sternum nigrum, viridi-aureo-squamulatum. Pedes longi, femoribus exceptis, fulvo-rufescentes, coxis posticis luteis, parce viridi-squamulatis, trochanteribus supra similiter squamulatis, femoribus utrinque late nigro-rivattatis, reliquis articulis, tarsis exceptis, utrinque fusco-lineatis, aculeis debilibus paucis ordinariis armati. Pedes-marijillares sat breves, nigri, apice femoris, patella tibiae pallide luteis, crasse et longe niveo-pilosus; tibia patella breviore, apophysibus apicalibus binis, superiore compressa lata, truncata et subtus minute dentata, inferiore gracili, acuta et infra directa, extus armata; tarsio longo, ad basin ovato et convexo, ad apicem longe attenuato et leviter curvato.

Forêt du Nirou.

44. *THIANIA DEMISSA* Thorell, Ann. Mus. civ. Gen., 2^a ser., X, 1890, p. 79 (nota) et St. Rag. mal. etc., IV, 2, 1891-92, p. 295.

D'après M. Bouchard cette araignée, qui est commune dans la forêt du Nirou, se construit une retraite très simple en pratiquant sur les feuilles des arbres une entaille semicirculaire; elle relève la partie découpée, la renverse sur la face supérieure en la maintenant par des fils de manière à constituer une petite loge où elle se tient à l'affût.

45. *THIANITARA SPECTRUM* E. Simon, Hist. nat. Ar., II, 1903, p. 1054 (nota). — ♂ Long. 5 mill. — *Cephalothorax planissimus, fusco-piceus, fere niger, parte cephalica leviter cyaneo-tincta, subtiliter coriaceus et fere glaber, margine frontali albo-pilosa. Pili oculorum albi, supra oculos sat longi et crassi, subtus viri distincti. Clypeus angustus, fere nudus, setis paucis uniseriatis tantum munitus. Abdomen angustum et longum, nigro-nitidum, glabrum. Mamillae nigrae, superiores apice luteo-testaceae. Chelae breves et latae, nigrae, intus rufulae, valde inaequales et striolatae. Partes oris sternumque nigro-nitida. Pedes 1^{er} paris reliquis multo longiores et crassiores, intense nigri, leviter cyaneo-tincti, falso luteo, tibia supra ad basin macula albo-pilosa ornata: femore compresso et clavato; tibia longe orata, subtus longe sed parum dense nigro-crinita et aculeis validis et longis 3-4 armata; metatarso longo, gracili, ad basin curvato, parce et longe nigro-crinito et subtus, prope medium, aculeis erectis binis, brevibus sed crassis, armato. Reliqui pedes flavido-testacei, patellis tibiis metatarsisque quatuor posticis intus olivaceo-lineatis, tibia 2^{er} paris aculeis inferioribus debilibus 3-3 et utrinque, in parte apicali, aculeo laterali, metatarso 2^{er} paris aculeis inferioribus similibus 2-2 et utrinque, in parte apicali, aculeo laterali armatis, tibiis quatuor posticis parce et minute aculeatis, metatarso*

3ⁱ paris aculeis apicalibus minutissimis munito sed metatarso & paris omnino nudiaco. Pedes-marillares mediocre, fuscopicei, parvo et longe nigro-criniti; tibia patella breviore, apophysi apicali articulo longiore, antice oblique directa, apice tenui et leviter incurva, extus armata; tarsu sat anguste orato, apice acuminato; bulbo orato, apice area magna rufula nuntito.

Forêt du Nirou.

16. EUPALIA RUBRA Workman, Malaysian Spiders, pars XIII, 1896, p. 104. (*Lycus*. — E. Simon, in Ann. Soc. ent. Belg., XLIII, 1899, p. 104).

Décrit de Singapore par T. Workman, nous l'avons déjà indiqué de Padang (Sumatra).

Forêt du Nirou.

17. DONOESSUS NIGRICEPS E. Simon, loc. cit. 1899, p. 103 (sub *Hassarius*).

Décrit de Padang.

Forêt du Nirou.

LV

ARACHNIDES RECUUEILLIS A LA TERRE-DE-FEU PAR M. LE D^E LEHMANN-NITSCHE EN MARS ET AVRIL 1902.

Les Arachnides dont je donne ci-après la liste ont été recueillis par le Dr Lehmann-Nitsche dans les environs du *Rio-del-Fuego* au Nord-Est de la Terre-de-Feu; en remontant le cours du fleuve cet habile voyageur a pu pénétrer dans l'intérieur des terres et explorer une région jusqu'ici inconnue, dont la faune paraît un peu différente de celle de la côte.

1. AUXIMUS FUEGANUS E. Simon, in Bull. Soc. zool. Fr., IX, 1884, p. 128 (*Amaurobius*).

Commun dans la région fuégienne et la Patagonie australe.

2. THERIDION MICHAELSENI E. Simon, in Hamb. Magalb. Sammelreise, Ar., 1902, p. 14.

Espèce variable comme coloration: l'un des individus capturés par le Dr Lehmann-Nitsche est conforme au type, son abdomen est d'un blanc jaunâtre pâle avec deux très larges bandes dorsales d'un blanc opaque, découpées et formées de taches irrégulières confluentes; un